



กระถินเทพา

Acacia mangium Willd.

ชื่ออื่น

กระถินซาบาคี

ชื่อสามัญ

Mangium

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 10 - 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลเข้ม เปลือกแตกเป็นร่องลึก ใบ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปใบหอก ปลายใบมน โคนใบสอบเรียบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายเยื่อ ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง ใบด้านล่างสีเขียว ท้องใบสีเขียว หน่ม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียว ใบกว้างประมาณ 3 - 6 x 8 - 20 เซนติเมตร การเรียงตัวของเส้นใบขนานตามความยาวใบ ดอก ออกเป็นช่อเชิงลด กลีบดอกในตาดอกเรียงจรดกัน วงกลีบดอกเชื่อมติดกันรูปดอกเข็ม กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผู้จำนวนมาก เกสรเพศเมีย 1 อัน ผล ผลแห้งแก่แตก ผลแตกตามรอยประสาน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีน้ำตาล ผลแก่สีน้ำตาลเข้ม ขนาด 0.5 - 0.8 x 2 - 3 เซนติเมตร เมล็ด รูปไข่ สีดำ ขนาดประมาณ 3 - 5 มิลลิเมตร เรียงไปตามความยาวของฝัก

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

พบในประเทศออสเตรเลีย และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินโดนีเซีย

การใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ใช้ทำเป็นเครื่องเรือน และไม้โครงสร้าง

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ให้ดอกสีขาวหรือสีเหลือง