

เม่าไข่ปลา

Antidesma ghaesembilla Gaertn.

ชื่ออื่น

ขะเม่าผา มะเม่า (ภาคอีสาน); มังเม่า (จันทบุรี); เม่าไข่ปลา (ชลบุรี); มะเม่าข้าวเบา (ชุมพร); เม่าทุ่ง (ชุมพร, สงขลา); กูแจ (มลายู - นราธิวาส)

ชื่อสามัญ

Black currant tree

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 15 เมตร กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนสั้น ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับกัน ยาว 5 - 7 x 3.5 - 4.5 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างกลมรูปไข่ถึงรูปรี เส้นแขนงใบ 5 - 7 คู่ หูใบเล็กและหลุดร่วงง่ายยอดสีเขียวอมแดงใบแก่ สีเขียวเข้ม ด้านบนเกลี้ยงถึงมีขนประปราย ด้านล่างมีขนสั้น ๆ ปลายใบมนกลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบมนกลมถึงหยักเว้า ก้านใบยาว 0.5 - 1 เซนติเมตร ดอก ไม่มีกลีบดอก ออกเป็นช่อ คล้าย ๆ หางหนูสั้น ๆ ออกตามง่ามใบใกล้ยอดและปลายกิ่งแต่ละช่อ ยาว 1 - 2 เซนติเมตร บางครั้งแยกเป็นช่อแขนงตามปลายกิ่ง แยกเพศอยู่ต่างต้น ผล ค่อนข้างกลม ผลแก่สีแดงคล้ำถึงดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ปลายประดับด้วยก้านเกสรเพศเมีย มี 1 เมล็ดต่อผล

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

ขึ้นตามป่าเต็งรังถึงป่าดิบเขาระดับต่ำ

การใช้ประโยชน์

งานสมุนไพร

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ให้ดอกสีเขียวอ่อน