



## ชงโค

*Bauhinia blakeana* Dunn

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ชื่ออื่น                | กะเฮอ (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); ชงโค (ภาคกลาง); สะเปซี (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน); เสี้ยวดอกแดง (ภาคเหนือ); เสี้ยวหวาน (แม่ฮ่องสอน)  |
| ชื่อสามัญ               | Hong Kong Orchid tree  |
| ลักษณะทั่วไป            | ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 12 เมตร ทรงพุ่ม ไม้แน่นอน แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง ใบ เดี่ยวเรียงสลับ ใบคล้ายรูปไต กว้าง 8 - 16 x 10 - 14 เซนติเมตร ปลายใบเว้าลึก โคนใบมนหรือเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดอกคล้ายใบแปด ดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 15 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ ผล ฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีก ฝักแบน ภายในมีเมล็ดกลมแบน |
| การกระจายตัวตามธรรมชาติ | มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของประเทศจีน รวมไปถึงฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   |
| การใช้ประโยชน์          | นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ  |
| ช่วงการออกดอก/สีดอก     | ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกตกในช่วงฤดูหนาว ให้ดอกสีชมพูม่วงถึงม่วงสด   |