



## เลี้ยว

*Bauhinia variegata* L.

- ชื่ออื่น** นางอ้ว (เชียงใหม่); เลี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ); เปียงพะโก (สุโขทัย); โพะเพ (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); ลำปาน (ลัวะ); ไฮ์รุหฺร่า (ปะหล่อง)
- ชื่อสามัญ** Mountain ebony tree
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้างถึงค่อนข้างกลม โดยมีลักษณะเป็น 2 พู ปลายใบเว้าลึก ส่วนโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ เส้นผ่านศูนย์กลางของใบประมาณ 6 - 18 เซนติเมตร และมีเส้นใบออกจากโคนของใบ ดอก มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามกิ่ง จำนวนดอกน้อย ดอกมีกลีบตั้ง มีเส้นริ้วด้านในสีเหลืองหรือสีแดงชัดเจน กลีบดอก 5 กลีบ เมื่อดอกบานจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 - 12 เซนติเมตร ฝักมีลักษณะแบน ฝักอ่อนเป็นสีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาล เมื่อแก่จะแตกเป็น 2 ซีก ฝักกว้าง 2 - 2.5 x 20 - 30 เซนติเมตร เมล็ดกลมมี 10 - 25 เมล็ด
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและมาเลเซีย พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงใต้
- การใช้ประโยชน์** นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกและใบอ่อนใช้รับประทานได้
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** ออกดอกในช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ให้ดอกแตกต่างกันตามสายพันธุ์ เช่น สีขาว สีชมพู