

เต่าร้าง

Caryota maxima Blume

- ชื่ออื่น** เต่าร้างยักษ์ (ภาคใต้); เขียงหลวง เขียงใหญ่ เต่าร้างดอย (ภาคเหนือ); จอย (แม่ฮ่องสอน); เต่าร้างแดง (นครศรีธรรมราช); มะเต็ง (ยะลา); จือเต็ง (มลายู - นราธิวาส)
- ชื่อสามัญ** Fishtail palm, Toddy plam.
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร ลำต้นขนาด 10 - 15 เซนติเมตร ใบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมหยักเว้า กว้างประมาณ 13 x 20 - 30 เซนติเมตร ปลายแหลมคล้ายหางปลา โคนใบรูปลิ้ม แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน กาบใบยาว 0.5 - 2 เมตร โคนกาบใบมีขนสีน้ำตาลแดงปนเทา หรือสีดำ และรอยางค์สีน้ำตาลปกคลุม ดอก ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหว่างกาบใบหรือใต้โคน กาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ช่อดอกยาว 60 - 80 เซนติเมตร ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 เซนติเมตร ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ออกเป็นพวง ๆ ทรงกลม ขนาด 2 เซนติเมตร ผลสุกสีแดงคล้ำ
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** มีถิ่นกำเนิดตั้งแต่ศรีลังกา อินเดีย ตอนใต้ของจีน ไทย และเวียดนาม
- การใช้ประโยชน์** นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** ออกดอกแล้วตาย ให้ดอกสีขาวอมเหลือง