



ตีนเป็ดทะเล

Cerbera odollam Gaertn.

- ชื่ออื่น** ตีนเป็ด ตีนเป็ดน้ำ (ภาคกลาง); ตุม (กาญจนบุรี); สังลา (กระบี่); มะตะกอ (มลายู - นราธิวาส)
- ชื่อสามัญ** Grey milkwood
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น ขนาดเล็ก ไม้ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบกิ่ง รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 7 x 15 – 30 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบเป็นมัน ดอก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 6 – 12 ดอก ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 – 4 เซนติเมตร กึ่งกลางดอกมีแต้มสีเหลือง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีกลิ่นหอม ผล กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีแดง พืชสกุลนี้มีอีกชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะคล้ายกันคือ ตีนเป็ดทราย (*C. manghas*) แตกต่างกันที่กึ่งกลางดอกมีแต้มสีแดง และผลมีขนาดเล็กกว่า
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** กระจายตามชายฝั่งในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าพรุ
- การใช้ประโยชน์** นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ผลแห้งใช้เป็นวัสดุเพาะชำกล้าไม้
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** ออกดอกตลอดปี ให้ดอกสีขาว