

## ส้มโอ

*Citrus maxima* (Burm.) Merr.

## ชื่ออื่น

โก้ยตะลอง (เขมร); มะขุน มะโอ (ภาคเหนือ); ลีมาบาลี (มลายู - ยะลา); ส้มอู (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)

## ชื่อสามัญ

Pomelo

## ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ แตกกิ่งก้านมากเป็นพุ่ม กิ่งอ่อนปกคลุมด้วยขนสั้น ๆ มีหนามยาวขนาด 1 - 5 เซนติเมตร ใบ รูปไข่ยาว แผ่นใบมองเห็นเป็นรอยเว้า แยกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน ขนาดแผ่นใบ ส่วนบนกว้างประมาณ 2 - 7 x 10 - 12 เซนติเมตร แผ่นใบส่วนล่างมีลักษณะปึก มีขนาดเล็กกว่าส่วนบน ดูโดยรวมเป็นรูปคล้ายหัวใจ เรียวสอบมาทางก้านใบ ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ดอก ดอกเดี่ยว พบออกเป็นช่อตามมุมใบหรือปลายยอด เป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงสีเขียว 5 กลีบ เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นกลุ่มประมาณ 4 - 5 กลุ่ม เกสรเพศเมียมีรังไข่ที่แบ่งเป็น 11 - 16 ช่อง ผล ผลชนิด berry ขนาดปานกลางถึงใหญ่ มีรูปร่างหลายแบบ เช่น ทรงกลม ทรงแป้น หรือผลยาวมีจุดคล้ายผลสาลี ผล อ่อนสีเขียว ผลแก่สีเขียวอ่อน หรืออมเหลือง เปลือกชั้นนอกมีลักษณะเหนียว มีต่อมน้ำมัน (oil gland) กระจายทั่วไปตามผิวของผล เปลือกชั้นกลาง สีขาวหรือสีชมพู มีลักษณะอ่อนนุ่ม หนาประมาณ 1 - 2.3 เซนติเมตร เปลือกผลชั้นในบางส่วนเจริญเป็นถุงน้ำหวาน (juice sac) เป็นส่วนที่รับประทานได้ มีสีขาว ครีမ် ชมพู หรือแดง รสชาติเปรี้ยว หรือเปรี้ยวอมหวาน จนถึงหวานสนิท บางพันธุ์อาจมีรสขมปนบ้าง

## การกระจายตัวตามธรรมชาติ

ถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## การใช้ประโยชน์

งานสมุนไพร ผลใช้รับประทาน

## ช่วงการออกดอก/สีดอก

ให้ดอกสีขาว