

## แต้ว

*Cratoxylum maingayi* Dyer

## ชื่ออื่น

แต้ว (นราธิวาส); แต้ว (นครศรีธรรมราช); แต้วคา (ยะลา)

## ชื่อสามัญ

Pruniflorum gogel

## ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ สูง 8 - 15 เมตร ลำต้นมีหนามรอบ ๆ แผ่กิ่งก้านออกเป็นทรงพุ่ม เนื้อไม้ค่อนข้างเหนียว กระจุกไขว้แกนสีน้ำตาลปนเหลือง มีน้ำยางเหนียวซึมออกมา ใบ ใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ตรงข้ามกัน ใบเรียวยาว ปลายแหลม ใบกว้าง 1.5 - 5 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ มีต่อมอยู่ใต้ใบ โคนใบและปลายใบสอบ หลังใบเป็นมัน มีสีเข้มกว่าท้องใบ เส้นแขนงใบมี 6 - 8 คู่ ยอดมีสีแดงเรื่อ ใบแก่สีเขียว ดอก ดอกเดี่ยว สมบูรณ์เพศ ออกเป็นดอกเดี่ยว ๆ หรือเป็นกระจุกตามง่าม กีบดอก 5 กีบ ดอกมีลักษณะมน กีบดอกรูปไข่ กีบรองดอกหนาเป็นรูปช้อนสีม่วงคล้ำ กีบดอกบางเป็นสีขาวหรือสีชมพูเรื่อ ๆ เกสรเพศผู้มีมาก ออกเป็นกระจุกอยู่กลางกีบดอก ผล ผิวของผลแข็ง รูปกระสวยสีน้ำตาลถึงน้ำตาลดำ มีนวลขาวติดบริเวณผิวผล กว้างประมาณ 0.5 x 1.5 เซนติเมตร เมื่อแก่จัดจะแตกตามรอยประสานเป็นสามแฉก เมล็ดมีปีกเป็นรูปโค้ง เรียงอัดแน่นก้านผลยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนกระจายอยู่ทั่ว ๆ ไป

## การกระจายตัวตามธรรมชาติ

มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยขึ้นตามป่า

เบญจพรรณในภาคเหนือภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

## การใช้ประโยชน์

ยอดอ่อนรับประทานได้

## ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ให้สีชมพูหรือสีขาว