



## หางนกยูงฝรั่ง

*Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่ออื่น	นกยูงฝรั่ง อินทรี (ภาคกลาง); หงอนยูง (ภาคใต้); นกยูง นกยูงฝรั่ง ชมพอหลวง ส้มพอหลวง (ภาคเหนือ); ยูงทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ชื่อสามัญ	Peacock flower
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูงได้ถึง 15 เมตร ลำต้นเกลี้ยง เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม โคนต้นเป็นพูพอน มักมีรากโผล่พื้นดินออกโดยรอบเมื่อโตเต็มที่ ระบบรากแข็งแรง ใบ ใบประกอบขนนกสองชั้นปลายใบคู่ เรียงสลับ ใบย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอก ออกเป็นช่อเชิงหลั่นขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งหรือกิ่งข้าง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ผล ฝักแห้ง แตกเป็น 2 ซีก กว้าง 5 – 6 เซนติเมตร ยาว 40 – 60 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มเกือบดำและแตกออก
การกระจายตัวตามธรรมชาติ	มีถิ่นกำเนิดในเกาะมาดากัสการ์และทวีปแอฟริกา
การใช้ประโยชน์	นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ช่วงการออกดอก/สีดอก	ออกดอกเดือนเมษายน – มิถุนายน ให้ดอกสีแดงอมส้ม ส้ม เหลือง