

แคนา

Dolichandrone serrulate (Wall. ex DC.) Seem.

ชื่ออื่น

ลักษณะทั่วไป

แคแก่ตเถา แคนขาว (เชียงใหม่); แคฝอย แคแน (ภาคเหนือ); แคทราย (นครราชสีมา); แคทราย (ลำปาง)
 ไม้ต้น ขนาดกลาง ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 - 20 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อนอมเทา อาจมีจุดดำประ
 ผิวนเรียบ หรือล่อนเป็นเกล็ดขนาดเล็ก ใบ ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายใบคี่ ออกตรงข้าม ใบ
 ย่อย 3 - 5 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขนาด 2.5 - 7 x 6 - 16 เซนติเมตร
 ขอบใบหยักแบบซี่ฟันตื้น ๆ ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นประปรายบน ก้านใบย่อยยาว 7 - 10 มิลลิเมตร
 ดอก ดอกเป็นช่อกระจุกสั้น ดอกใหญ่ รูปแตร สีขาว ออกตามปลายกิ่งยาว 2 - 3 เซนติเมตร ก้านดอก
 ยาว 1.8 - 4 เซนติเมตร แต่ละช่อมี 2 - 10 ดอก กลีบเลี้ยงหนาและเหนียว ปลายเรียวเล็กโค้งยาว 3 -
 4 เซนติเมตร จะหุ้มดอกตูมมิด เชื่อมติดกันเป็นหลอดโค้งปลายแหลม เมื่อดอกบานจึงมีรอยแตกทาง
 ด้านล่าง มีลักษณะเป็นกาบหุ้มกลีบดอก ติดกันเป็นท่อ ปลายขยายออกเป็นรูประฆัง และแยกออก
 เป็น 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ยาว 16 - 18 เซนติเมตร หลอดกลีบดอกยาว 13 - 14 เซนติเมตร
 ส่วนโคนแคบคล้ายหลอด สีเขียวอ่อน ส่วนบนบานออกคล้ายกรวยสีขาวแกมชมพู แฉกกลีบดอกมี 5
 กลีบ รูปไข่ ยาว 3 - 4 เซนติเมตร ขอบกลีบย่นเป็นคลื่น ดอกตูมสีเขียวอ่อน ๆ โคนกลีบมีสีน้ำตาลปน
 เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดอยู่ที่ด้านในของท่อกลีบดอก ปลายแยกมีขนาดสั้น 2 อัน ยาว 2 อัน และมีเกสร
 เพศผู้ที่เป็นหมัน 1 อัน รูปร่างเป็นเส้นเรียวยาวเล็กรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร อับเรณูยาว
 ประมาณ 1 เซนติเมตร สีเทาดำ จานฐานดอกรูปเบาะ เป็นพู่ตื้น ๆ เกสรเพศเมีย 1 อัน ผลเป็นฝัก ช่อ
 ละ 3 - 4 ฝัก แบบ รูปขอบขนาน โค้ง บิดเป็นเกลียว ยาว 40 - 60 เซนติเมตร

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม

การใช้ประโยชน์

ใช้ประกอบอาหารได้ เนื้อไม้ใช้ในงานก่อสร้าง

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน ให้ดอกสีขาว