



ไคร้หน้า

Elaeocarpus grandiflorus Sm.

ชื่ออื่น

กาบพร้าว (นราธิวาส); คล้ายสองหู ผีหน้าย (สุราษฎร์ธานี); จิก ดอกปีใหม่ (กาญจนบุรี); แต้วน้ำ (บุรีรัมย์); ปุ่มปา (เลย); มุ่นน้ำ (เพชรบูรณ์); สารภีน้ำ ไคร้อย้อย (เชียงใหม่); อะโน (ปัตตานี)

ชื่อสามัญ

Fairy petticoats, Lily of the valley

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ สูง 5 - 30 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง พุ่มใบทึบ แตกกิ่งต่ำ กิ่งอ่อนเกลี้ยง เปลือกต้นเรียบหรือหยาบเล็กน้อย สีน้ำตาลปนเทา ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปรีหรือรูปใบหอก กว้าง 1.5 - 5.5 x 7 - 19 เซนติเมตร ปลายใบแหลมทู่ โคนใบสอบแคบ ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างมีขนประปราย ใบหนา เส้นแขนงใบข้างละ 6 - 19 เส้น เส้นใบย่อยเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 0.5 - 4 เซนติเมตร ดอก สีขาว มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุก ห้อยลง ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 6 - 10 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปใบหอกสีขาวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับมีขนประปรายทั้งสองด้าน โคนกลีบดอกด้านมีกลุ่มขนเรียงตัวเป็นสองแถว ปลายกลีบเป็นริ้วละเอียด รังไข่ป้อมมีขนสั้นคลุมแน่น ดอกบานเต็มที่กว้าง 2 - 2.5 เซนติเมตร ผล ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว รูปทรงกระสวยหรือรูปรี กว้าง 1.5 - 2 x 3 - 4 เซนติเมตร ผิวผลบางเรียบ เกลี้ยง มีเมล็ดรูปกระสวย ก้านผลยาว 2 - 6 เซนติเมตร

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน พบตามป่าโปร่งและป่าเบญจพรรณทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 50 - 800 เมตร

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกตลอดทั้งปี ให้ดอกสีขาว