



โมกหลวง

Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don

ชื่ออื่น

ยางพุด มุกขาว (เลย); พุด (กาญจนบุรี); พุทธรักษา (เพชรบุรี); มุกมันน้อย มุกมันหลวง มุกหลวง โมกเขา โมกทุ่ง (ภาคเหนือ); โมกใหญ่ (ภาคกลาง); หนามเนื้อ (เงี้ยว - ภาคเหนือ); ซอที พอแก ส่าตี (กะเหรี่ยง - แม่ฮ่องสอน)

ชื่อสามัญ

Kurchi

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ผลัดใบ สูง 5 - 10 เมตร ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม กว้าง 3.5 - 14 x 7 - 30 เซนติเมตร ก้านใบยาว 0.4 - 1.2 เซนติเมตร แผ่นใบบาง คล้ายกระดาษ รูปรีหรือขอบขนาน โคนใบป้านหรือรูปลิ้น ปลายเรียวแหลม หรือเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบ ผิวใบด้านบนและด้านล่างเป็นมัน เกลี้ยง หรือมีขนสั้นนุ่ม ดอก เป็นช่อแบบช่อกระจุก ดอกย่อยมีก้าน ดอกย่อยที่ด้านข้างเท่ากัน มีขนาดเล็กกว่าดอกย่อยที่ตรงกลางช่อ ช่อดอกยาว 4 - 14 เซนติเมตร ก้านช่อยาว 0.9 - 3.5 เซนติเมตร หรือไม่มีก้านช่อ ทุกส่วนเกลี้ยง หรือมีขนสั้นนุ่ม ดอกย่อยประกอบด้วย ก้านดอกย่อยสั้นมากหรือไม่มีก้าน ก้านดอกย่อย วงกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยก 5 แฉก ปลายของแต่ลู่แฉกแหลม วงกลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูปดอกเข็ม ปลายแยก 5 แฉก กว้างประมาณ 0.4 - 0.8 x 0.7 - 2.3 เซนติเมตร รูปขอบขนาน ปลายมน เกสรเพศจำนวน 5 อัน แยกกัน เกสรเพศเมีย 1 อัน อยู่เหนือวงกลีบ ผล แตกแนวเดียว รูปแถบเรียวยาว กว้างประมาณ 0.5 x 37 - 45 เซนติเมตร ก้านผลยาว 1.6 - 2.5 เซนติเมตร เมล็ดจำนวนมาก มีปีกบาง

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

พบตามป่าเต็งรังทั่วไป ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง

การใช้ประโยชน์

งานสมุนไพร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม ให้ดอกสีขาว