

ตะแบกนา

Lagerstroemia floribunda Jack var. *floribunda*

ชื่ออื่น

กระแบก (ภาคใต้); ตราแบกปรี (เขมร); ตะแบกไข่ (ราชบุรี, ตราด); ตะแบกนา ตะแบก (ภาคกลาง, นครราชสีมา); บางอตะมะกอ บางอยะมู (มลายู); เปื่อยนา เปื่อยต้อง เปื่อยหางค่าง (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ

Thai crape myrtle

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร เรือนยอดรูปไข่ โคนต้นเป็นพุ่มพอง เปลือกนอกสีเทาอมขาว แตกร่อนเป็นหลุมตื้น ๆ ทำให้ผิวเปลือกต่างเป็นวงกระจายทั่วลำต้น เนื้อไม้ละเอียด แข็ง ใจกลางมักเป็นโพรง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 5 – 8 × 8 – 20 เซนติเมตร โคนใบมนหรือสอบเรียว ขอบใบห้อยขึ้น ปลายใบมน มีติ่งแหลมเล็ก แผ่นใบบางแต่ค่อนข้างเหนียว สีเขียวทึบเป็นมัน ใบอ่อนสีแดงอมชมพู มีขนละเอียดรูปดาว ดอก ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย มีสันนูนตามยาว และมีขนสั้น ประปราย ปลายแยกเป็น 6 แฉก กลีบดอก 6 กลีบ ทรงกลม ออกสลับกับกลีบเลี้ยง โคนคอดเรียวเป็นก้านสั้น ๆ กลีบดอกบางยับย่น เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผล ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู รูปรี หรือรูปไข่ กว้าง 1 – 1.5 × 1.2 – 2 เซนติเมตร เปลือกเกลี้ยง แข็ง มีกลีบเลี้ยงติดตรงจุดผล เมื่อสุกสีน้ำตาล เมล็ดสีน้ำตาลอมเหลือง แบน มีปีก จำนวนมาก

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

พบตามป่าเบญจพรรณขึ้น และพื้นที่ราบลุ่ม ทุกภาคของประเทศไทย

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกเดือนพฤศจิกายน–เดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม–เดือนกรกฎาคม

ให้ดอกสีม่วงอมชมพู