

อินทนิลน้ำ

Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.

ชื่ออื่น

ตะแบกดำ (กรุงเทพฯ); ฉ่องมู ฉ่องพนา (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); บางอบะซา (นราธิวาส); บาเย บาเอ (มลายู - ปัตตานี); อินทนิล (ภาคกลาง, ภาคใต้)

ชื่อสามัญ

Queen's crape myrtle

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10 – 24 เมตร เรือนยอดกลมแผ่กว้าง เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ มีรอยด่างเป็นดวงสีขาว เปลือกในส้ม หรือน้ำตาลอ่อน ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม หรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปรี หรือรูปขอบขนาน กว้าง 6 – 10 x 11 – 26 เซนติเมตร โคนใบมนหรือกลม ขอบใบเรียบห้อยกขึ้น ปลายใบแหลมเป็นติ่ง แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว สีเขียวสด เรียบเป็นมัน ใบอ่อนสีเขียวอมน้ำตาล มีขนละเอียดรูปดาว ลักษณะดอก ช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยสีม่วงสด ม่วงปนชมพู หรือขาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย มีสันนูนตามยาว และมีขนสั้นประปราย ปลายแยกเป็น 6 แฉก กลีบดอก 6 กลีบ ทรงกลม โคนคอดเรียวเป็นก้านสั้น ๆ กลีบดอกบาง ยับย่น เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผล ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู รูปไข่ กว้าง 1.5 – 2 x 2 – 2.5 เซนติเมตร เปลือกแข็ง ผิวเกลี้ยง มีกลีบเลี้ยงติดตรงจุดผล เมื่อสุกสีน้ำตาล เมล็ดสีน้ำตาลอมเหลือง แบน มีปีกจำนวนมาก

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

กระจายตามที่ราบลุ่มริมน้ำ ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทุกภาคของประเทศไทย

การใช้ประโยชน์

นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ติดผลเดือนมีนาคม – มิถุนายน

ให้ดอกสีม่วง