



## สารภี

*Mammea siamensis* T.Anderson

- ชื่ออื่น** สารภีแนน (เชียงใหม่); ทรพี สารพี (จันทบุรี); สร้อยพี (ภาคใต้)
- ชื่อสามัญ** Negkassar
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูงประมาณ 10 - 15 เมตร เรือนยอดรูปไข่ทึบ เปลือกต้นสีเทาปนดำ แตกออกเป็นสะเก็ดตลอดลำต้น มีน้ำยางสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ขนาด 4 - 6.5 x 14 - 20 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือหยักเว้าตื้น ๆ โคนใบสอบเรียว ผิวใบเกลี้ยง สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบหนาคล้ายหนัง ขอบใบเรียบมีเส้นใบย่อยแบบร่างแหชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อใบแห้ง ก้านใบยาว 0.5 - 1.5 เซนติเมตร ดอก ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกตามกิ่ง มีกลิ่นหอมมาก กลีบดอก 4 กลีบ กลีบเลี้ยง 2 กลีบ มีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ผล ผลมีลักษณะเป็นรูปกระสวยหรือกลมรี ขนาดประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร ผิวผลเรียบ ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีเหลืองอมส้ม เนื้อผลนิ่ม ผลเมื่อแก่จะแตกออกได้ เมล็ดเดี่ยว
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** พบขึ้นตามป่าเบญจพรรณและตามป่าดงดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออก และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 20 - 400 เมตร
- การใช้ประโยชน์** งานสมุนไพร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** ออกดอกช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ให้ดอกสีขาว