



เพกา

Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz

ชื่ออื่น

กาใต้ดั้ง (กะเหรี่ยง - กาญจนบุรี); มะลิ้นไม้ มะลิติไม้ ลิตไม้ (ภาคเหนือ) ลิ่นฟ้า (เลย, ภาคอีสาน)

ชื่อสามัญ

Indian trumpet flower

ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น กิ่งผลัดใบหรือไม่ผลัดใบ เรือนยอดเล็ก สูง 5 - 12 เมตร กิ่งเปราะหักง่าย แตกกิ่งก้านน้อย ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้น ปลายใบคี่ ใบขนาดใหญ่ ยาว 60 - 200 เซนติเมตร เรียงตรงข้ามกันอยู่บริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยรูปไข่รี ขนาด 4 - 8 x 6 - 12 เซนติเมตร ปลายยาว ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบแคบ ใบเกลี้ยงหรือมีขนสีขาวสั้น ๆ ท้องใบนวล ก้านใบย่อยยาว 5 - 8 มิลลิเมตร ก้านใบข้าง และก้านใบร่วมโค้งพองออกที่ฐานและที่ข้อ ก้านใบยาว 0.5 - 2 เมตร ดอก ดอกช่อขนาดใหญ่แบบกระจุก ออกที่ปลายยอดเป็นกระจุก ดอกย่อย 20 - 35 ดอก ขนาดใหญ่ 8 - 12 เซนติเมตร บานพร้อมกันคราวละ 2 - 3 ดอก ก้านช่อดอกยาว 60 - 180 เซนติเมตร ยื่นออกมานอกทรงพุ่มของยอด หลอดกลีบดอกยาว 2 - 4 เซนติเมตร รูปแตร กลีบดอกหนา ขอบย่น ไม่มีพู หรือพูไม่เท่ากัน มีต่อมกระจายอยู่ด้านนอก ด้านในมีขนหนาแน่น มักจะมีดอกและผลในกิ่งเดียวกัน เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดกับหลอดดอก โคนก้านมีขน เกสรเพศเมีย 1 อัน กลีบเลี้ยงยาว 2 - 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูปทรงกระบอก ปลายไม่แยกเป็นกลีบอย่างเด่นชัด ผล เป็นฝักแบน โค้งเล็กน้อยที่ฐาน มีสันเล็ก ๆ ที่ด้านข้าง คล้ายรูปลิ้น หรือรูปดาบ สีน้ำตาลเข้ม สีแดง เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดแบน สีขาว ขนาด 4 - 8 เซนติเมตร มีปีกบางโปร่งแสง

การกระจายตัวตามธรรมชาติ

ป่าเต็งรัง ป่าทุ่ง ป่าผสมผลัดใบ บริเวณ ไร่ สวน

การใช้ประโยชน์

งานสมุนไพร ฝักรับประทานได้

ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม กลีบดอกสีนวลแกมเขียวโคนกลีบเป็นหลอดสีม่วงแดงหรือม่วงด้านนอก