



## กระท้อน

*Sandoricum koetjape* (Burm.f.) Merr.

<b>ชื่ออื่น</b>	เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้); มะต๋อง (ภาคเหนือ, อุดรธานี); มะตั้น (ภาคเหนือ); สติยา สะตุ (มลายู - นราธิวาส); สะโต (มลายู - ปัตตานี)
<b>ชื่อสามัญ</b>	Santol
<b>ลักษณะทั่วไป</b>	ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาล แตกกิ่งเป็นสะเก็ดใหญ่หรือเป็นปุ่มปม โคนต้นแก่เป็นพูพอน ใบ ใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียน มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่หรือรูปรีค่อนข้างกลม กว้าง 5 - 11 x 10 - 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบเบี้ยว เล็กน้อย ขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบ สีเขียว ด้านล่างมีขนตามเส้นใบใบอ่อนมีขนสีเหลือง ใบแก่สีแดง ก้านใบย่อยปลายสุดยาว 2.5 - 5 เซนติเมตร ก้านใบย่อยคู่ล่างยาว 2 - 8 มิลลิเมตร ดอก ออกเป็นช่อแบบแยกแขนงตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวถึง 15 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนาน เกสรเพศผู้มี 10 อัน ติดกันเป็นหลอด ทอยอบานนาน 7 - 10 วันจึงโรยและเริ่มติดผล ผล กลมแป้น ขนาด 5 - 8 เซนติเมตร หรือมีขนาดใหญ่ได้ถึง 20 เซนติเมตร ผิวเป็นกำมะหยี่สีเหลืองอมส้ม ภายในแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เนื้อแข็งด้านนอก และด้านใน เนื้อนุ่มเป็นปุยสีขาวที่หุ้มเมล็ดไว้ เปลือกหนา มียางสีขาวเล็กน้อย ผลสุกสีเหลืองนวล ผิวเริ่มย่น เมล็ดเมล็ดมี 3 - 5 เมล็ด เนื้อหุ้มเมล็ดเป็นปุยสีขาวมีรสเปรี้ยวหรือหวาน
<b>การกระจายตัวตามธรรมชาติ</b>	พบกระจายตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง หรือริมลำห้วยทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
<b>การใช้ประโยชน์</b>	ผลใช้รับประทาน งานสมุนไพร
<b>ช่วงการออกดอก/สีดอก</b>	ออกดอกช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ให้ดอกสีเหลืองอมเขียว