



## มะค่าแต้

*Sindora siamensis* Teijsm. ex Miq. var. *siamensis*

### ชื่ออื่น

กรอกก้อส (เขมร - พระตะบอง); กอกก้อ (ชาวบน - นครราชสีมา); ก่อเก๊าเซ ก้าเก๊าเซ (เขมร - สุรินทร์); มะค่าหยม มะค่าหนาม (ภาคเหนือ) แต้ แต้หนาม (ภาคอีสาน); มะค่าหนาม มะค่าแต้ มะค่าลิง (ภาคกลาง)

### ลักษณะทั่วไป

ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น ๆ สูง 10 - 25 เมตร เปลือกต้นเรียบ สีเทาคล้ำ กิ่งอ่อนมีขนคลุมบาง ๆ เรือนยอดแผ่ทรงเจดีย์ต่ำ ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย เรียงตรงข้ามกัน 3 - 4 คู่ แผ่นใบย่อยรูปรี ถึงรูปบรรทัดแกมรูปรี ขนาดกว้าง 3 - 8 x 6 - 15 เซนติเมตร ปลายใบกลมหยักเว้าตื้น ๆ ตรงกลางเล็กน้อย และโคนใบแหลมหรือมน ผิวใบด้านล่าง มีขนสั้น ดอกออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล เป็นรูปโล่ ขนาด 4 - 9 เซนติเมตร มีจะงอยแหลมที่ปลาย ผิวฝัก มีหนามแหลมแข็ง แตกเมื่อแห้ง แต่ละฝักมีเมล็ด 1 - 3 เมล็ด

### การกระจายตัวตามธรรมชาติ

กระจายตั้งแต่ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณถึงป่าเต็งรังค่อนข้างแล้ง

### การใช้ประโยชน์

เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง

### ช่วงการออกดอก/สีดอก

ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ให้ดอกเล็กสีเหลือง