

ลำโรง

Sterculia foetida L.

- ชื่ออื่น** จำมะโฮง (เชียงใหม่); มะโรง มะโทรง (ปัตตานี); โหมโรง (ภาคใต้)
- ชื่อสามัญ** Bastard poon
- ลักษณะทั่วไป** ไม้ต้น ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดรูปไข่ถึงทรงกระบอก ลำต้นเปลาตรง โคนมีพูพอนต่ำ ๆ เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทา ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ กางแผ่ออกจากจุดเดียวกันเรียงเวียนจากจุดเดียวกัน เรียงเวียนตอนปลายกิ่ง ใบย่อย 5 - 7 ใบ รูปรีหรือรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 3.5 - 6 x 10 - 30 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือมีติ่งแหลม โคนใบรูปลิ้ม แผ่นใบหนา ใบเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 17 - 21 เส้น ก้านใบประกอบยาว 13 - 20 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 3 - 5 เซนติเมตร ดอก มีกลิ่นเหม็นมาก ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง หรือซอกใบ ปลายกิ่งช่อดอกยาว 10 - 30 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ปลายม้วนออก ดอกบานเต็มที่ กว้าง 2 - 2.5 เซนติเมตร ผล ผลแห้งแตกรูปไต เปลือกแข็งเหมือนไม้ สีแดงปนน้ำตาล ผิวมันและเกลี้ยง เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก กว้าง 6 - 9 x 8 - 10 เซนติเมตร เมล็ด สีดำ มัน รูปขอบขนาน กว้าง 3 x 2.5 เซนติเมตร
- การกระจายตัวตามธรรมชาติ** พบอยู่ตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และตามป่าโปร่งทั่วไป ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 100 - 600 เมตร
- การใช้ประโยชน์** งานสมุนไพร
- ช่วงการออกดอก/สีดอก** ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ให้ดอกสีแดงหรือสีแสด