



จันทน์กะพ้อ

Vatica diospyroides Symington

ชื่ออื่น	เขี้ยวภูเขา (พังงา); จันทน์พ้อ (ภาคใต้)
ชื่อสามัญ	Broken hear flower
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้น ขนาดเล็กถึงกลาง ไม้ผลัดใบ สูงประมาณ 5 - 15 เมตร เรือนยอดเป็นทรงพุ่มกลมโปร่ง เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาลอมเทาหรือสีเทาค้ำ และมักมียางใสซึมออกมาตามรอยแตก ส่วนเปลือกชั้นเป็นสีเหลือง ใบ ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปขอบขนาน กว้าง 5 - 7 x 14 - 20 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบและเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ใบอ่อนสีน้ำตาลแดง ใบแก่สีเขียวเข้มเป็นมัน แผ่นใบเกลี้ยงหนา มีเส้นแขนงของใบประมาณ 15 - 18 คู่ ปลายเส้นโค้งจรดกับขอบใบ โคนใบเบี้ยว และจะหลุดร่วงไปตามอายุ ส่วนก้านใบยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามกิ่งและตามง่ามใบ ขนาดเล็กและมีกลิ่นหอม กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันเป็นรูปกังหัน มีขนนุ่มเป็นสีน้ำตาล ส่วนกลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก 5 แฉก มีขนปกคลุม เมื่อเริ่มปลุกจะใช้เวลาประมาณ 6 - 7 ปีถึงจะออกดอก ผล มีลักษณะกลมรี มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 - 3 เซนติเมตร ผิวผลเป็นขุยสีน้ำตาล ผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น 3 กลีบ มีกลีบประดับ 5 กลีบสั้นกว่าตัวผล โดยกลีบผลมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมสั้นกว่าความยาวของผล ขอบกลีบพับจีบตามยาว มีเมล็ดลักษณะเป็นรูปไข่ปลายแหลม

การกระจายตัวตามธรรมชาติ	ถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้งในประเทศไทย
การใช้ประโยชน์	งานสมุนไพร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ช่วงการออกดอก/สีดอก	ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม ให้ดอกสีเหลืองนวล